


САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2003 года ПО МАТЕМАТИКЕ
I тур. 6 класс.

1. Составьте из цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 три трехзначных числа так, чтобы сумма двух чисел равнялась третьему и при этом у одного из этих чисел цифра десятков была равна 8. (Каждую цифру нужно использовать один раз.) (А. Храбров)

2. Голодные Малыш и Карлсон съели торт и стали сытыми. Известно, что голодный Карлсон легче сытого Малыша, а сытый Карлсон весит столько же, сколько два голодных Малыша. Что весит больше: торт или голодный Малыш? Не забудьте обосновать свой ответ. (К. Кохась)

3. В школе, где учится больше 225, но меньше 245 учеников, часть учеников являются отличниками, а остальные — хорошистами. После сложной контрольной работы $\frac{2}{7}$ отличников стали хорошистами, а хорошисты так и остались хорошистами за исключением одного человека, который стал троечником. При этом хорошистов и отличников стало поровну. Сколько учеников могло быть в школе? Приведите все возможные варианты ответа.

4. Саша заметил, что если из прямоугольника 7×9 вырезать **любую внутреннюю клетку** и оставшуюся часть прямоугольника разрезать на 6 частей так, как показано на рисунке, то из этих 6 частей не удастся составить прямоугольник. Объясните, почему.



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2003 года ПО МАТЕМАТИКЕ
I тур. 7 класс.

1. Придумайте девятизначное натуральное число, в записи которого присутствует хотя бы одна единица, хотя бы одна тройка и хотя бы одна семерка, и такое, что:

— если в нем вычеркнуть все единицы, то получится число, делящееся на 73;

— если в нем вычеркнуть всех тройки, то получится число, делящееся на 71;

— если в нем вычеркнуть все семерки, то получится число, делящееся на 13.


(К. Кохась)

2. В роще растут 18 дубов. На них поровну желудей. Подул ветер и с некоторых дубов осыпались желуди: с каких-то — ровно половина, с каких-то — ровно треть, с остальных же ничего не упало. При этом со всех дубов вместе упала ровно одна девятая часть всех желудей. Со скольких дубов желуди не упали?

(А. Храбров)

3. Равносторонний треугольник ABC разрезан прямыми линиями на 7 равносторонних треугольничков и 3 равносторонних шестиугольника. Справа приведен искаженный чертеж этого разбиения, в котором многие прямые линии искривлены. У какого закрашенного треугольничка сторона на самом деле больше — у прилегающего к вершине A или к вершине C ?

(К. Кохась, Р. Семизаров)



4. В Бразилии живет много-много диких обезьян. Каждый год 2 января всех обезьян пересчитывают. В 1999 г. количество обезьян увеличилось по сравнению с 1998 г. ровно на 5%. И в 2000–2003 гг. прирост поголовья обезьян каждый год тоже составлял ровно 5%, причем по данным переписи 2003 г. в стране проживало не более 5 000 000 диких обезьян. Сколько диких обезьян жило в Бразилии 2 января 2003 года?

(К. Кохась)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2003 года ПО МАТЕМАТИКЕ
I тур. 8 класс.

1. Можно ли расставить в таблице 3×3 девять различных четырехзначных чисел так, чтобы сумма чисел в любых двух соседних клетках делилась нацело на 2003? (Соседними считаются клетки таблицы, прилегающие друг к другу по горизонтали или вертикали.)

2. Дан выпуклый четырехугольник $ABCD$. Серединный перпендикуляр к диагоналям BD и AC пересекают сторону AD в точках X и Y соответственно, причем X лежит между A и Y . Оказалось, что прямые BX и CY параллельны. Докажите, что прямые BD и AC перпендикулярны. (С. Берлов)

3. У натурального числа n есть такие два различных натуральных делителя a и b , что

$$(a - 1)(b + 2) = n - 2.$$

Докажите, что $2n$ — квадрат натурального числа.

4. На окружности длины 101 см отмечена 101 точка. Отмеченные точки делят окружность на равные дуги. Вася поставил в одну из этих точек фишку и двигает ее по таким правилам: за один ход можно передвинуть фишку по часовой стрелке на 6, 7, 8, 9 или 10 см (расстояние измеряется по окружности), при этом фишка должна оказаться в отмеченной точке, в которой еще ни разу не была. Вася уже сделал 45 ходов. Докажите, что он сможет сделать еще один ход.

5. Учительница написала на доске в ряд 13 чисел (не обязательно целых), причем каждое следующее число больше предыдущего на одну и ту же величину. Каждый ученик вычислил сумму каких-то трех из написанных чисел. Один из учеников получил в ответе 0, другой — $3\frac{1}{2}$, а третий — $6\frac{1}{3}$. Докажите, что кто-то из них ошибся.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2003 года ПО МАТЕМАТИКЕ
I тур. 9 класс.

1. Модуль разности корней квадратного трехчлена $ax^2 + bx + c$ не меньше 10. Докажите, что модуль разности корней квадратного трехчлена $ax^2 + 2bx + 3c$ больше 17. (А. Храбров)

2. В роще росли сосны, кедровые и лиственничные, причем на всех деревьях было поровну шишек. Подул легкий ветерок и несколько шишек упало на землю. Оказалось, что с каждой сосны упало ровно 11% ее шишек, с каждого кедра — ровно 54%, а с каждой лиственничной — ровно 97%. При этом со всех деревьев вместе упало ровно 30% всех висевших на них шишек. Докажите, что количество деревьев в роще делится на 43. (А. Храбров)

3. На окружности длины 101 см отмечена 101 точка. Отмеченные точки делят окружность на равные дуги. Вася поставил в одну из этих точек фишку и двигает ее по таким правилам: за один ход можно передвинуть фишку по часовой стрелке на 6, 7, 8, 9 или 10 см (расстояние измеряется по окружности), при этом фишка должна оказаться в отмеченной точке, в которой еще ни разу не была. Вася уже сделал 45 ходов. Докажите, что он сможет сделать еще один ход.

4. На стороне BC треугольника ABC отмечены такие точки M и N , что $CM = MN = NB$. К стороне BC в точке N построен перпендикуляр, пересекающий сторону AB в точке K . Оказалось, что площадь треугольника AMK в 4,5 раза меньше площади исходного треугольника. Докажите, что исходный треугольник равнобедренный.

5. Найдите все положительные решения уравнения

$$5[x^2] + 5[x] - x^2 - x = 2000.$$

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2003 года ПО МАТЕМАТИКЕ
I тур. 10 класс.

1. Модуль разности корней квадратного трехчлена $ax^2 + bx + c$ не меньше 10. Докажите, что модуль разности корней квадратного трехчлена $ax^2 + 2bx + 3c$ больше 17. (А. Храбров)

2. Можно ли расставить числа $-11, -10, -9, \dots, 13, 14$ в вершинах, на ребрах и на гранях куба (у куба 8 вершин, 12 ребер и 6 граней) так, чтобы число на любом ребре куба равнялось сумме чисел, стоящих в его концах, а число на любой грани этого куба равнялось сумме четырех чисел, стоящих на ее сторонах? (Ф. Бахарев)

3. На окружности длины 101 см отмечена 101 точка. Отмеченные точки делят окружность на равные дуги. Вася поставил в одну из этих точек фишку и двигает ее по таким правилам: за один ход можно передвинуть фишку по часовой стрелке на 6, 7, 8, 9 или 10 см (расстояние измеряется по окружности), при этом фишка должна оказаться в отмеченной точке, в которой еще ни разу не была. Вася уже сделал 45 ходов. Докажите, что он сможет сделать еще один ход.

4. Серединные перпендикуляры к диагоналям BD и AC вписанного четырехугольника $ABCD$ пересекают сторону AD в точках X и Y соответственно. Докажите, что середина стороны BC равноудалена от прямых BX и CY . (С. Берлов)

5. Натуральное число $n > 100$ разделили с остатком на 10, 35 и 42. Оказалось, что сумма остатков от деления на 35 и 42 равна остатку от деления на 10. Докажите, что число n — составное. (А. Храбров)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2003 года ПО МАТЕМАТИКЕ
I тур. 11 класс.

1. Приведите пример девятизначного натурального числа, в десятичной записи которого имеется хотя бы одна единица, хотя бы одна пятерка и хотя бы одна девятка, и такое что

— если в нем вычеркнуть все пятерки, то получится число, делящееся на 13;

— если в нем вычеркнуть все девятки, то получится число, делящееся на 17;

— если в нем вычеркнуть все единицы, то получится число, делящееся на 19.

(К. Кохась)

2. У натурального числа n есть такие два различных натуральных делителя a и b , что

$$(a - 1)(b + 2) = n - 2.$$

Докажите, что $2n$ — квадрат натурального числа.

3. Касательная в точке A к описанной окружности треугольника ABC пересекает продолжение стороны BC за точку B в точке K . L — середина AC , точка M на отрезке AB такова, что $\angle AKM = \angle CKL$. Докажите, что $MA = MB$.

(Ф. Бахарев)

4. На окружности отмечены 40 точек и нарисованы 5 треугольников с вершинами в этих точках. Треугольники не пересекаются, в том числе, не имеют общих вершин. Докажите, что можно нарисовать еще один треугольник с вершинами в отмеченных точках так, чтобы он не имел общих точек с уже нарисованными треугольниками.

(К. Кохась, Е. Сопкина)

5. Докажите, что не существует функции $f(x)$, заданной при всех вещественных x и принимающей вещественные значения, такой что для всех целых x

$$f(-x^2 + 3x + 1) = f^2(x) + 2.$$

(Ф. Петров)